



Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie Nº: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">54</p>
	<p style="text-align: center;">DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 87
	<p style="text-align: center;">ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado
	Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p>	


Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">55</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 106
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado
	Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie Nº: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">56</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica</i> Mill ex Muenchh
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 100
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado
	Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie Nº: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">57</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 77
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado
	Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie Nº: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">58</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica</i> Mill ex Muenchh
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 83
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado
	Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie Nº: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">59</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 84
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado
	Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie Nº: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">60</p>
	<p style="text-align: center;">DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica</i> Mill ex Muenchh
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 101
	<p style="text-align: center;">ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado
	Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">61</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica</i> Mill ex Muenchh
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 78
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco recto aplomado, cruz alineada y abultada. Copa centrada reducida. Estructura de tipo reactivo con orden de ramificación poco desarrollado
	Corteza: Cerrada. Secciones de poda pequeñas con madera sana
Estado fitopatológico: Aceptable, afección sobrellevada por <i>Corythucha ciliata</i> sin focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	


Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">62</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 67
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco recto aplomado, cruz alineada y abultada. Copa centrada reducida. Estructura de tipo reactivo con orden de ramificación poco desarrollado
	Corteza: Cerrada. Secciones de poda pequeñas con madera sana
Estado fitopatológico: Aceptable, afección sobrellevada por <i>Corythucha ciliata</i> sin focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	


Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">63</p>
	<p style="text-align: center;">DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica</i> Mill ex Muenchh
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 68
	<p style="text-align: center;">ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco recto aplomado, cruz alineada y abultada. Copa centrada reducida. Estructura de tipo reactivo con orden de ramificación poco desarrollado
	Corteza: Cerrada. Secciones de poda pequeñas con madera sana
Estado fitopatológico: Aceptable, afección sobrellevada por <i>Corythucha ciliata</i> sin focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie Nº: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">64</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 78
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco recto aplomado, cruz alineada y abultada. Copa centrada reducida. Estructura de tipo reactivo con orden de ramificación poco desarrollado
	Corteza: Cerrada. Secciones de poda pequeñas con madera sana
Estado fitopatológico: Aceptable, afección sobrellevada por <i>Corythucha ciliata</i> sin focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	


Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">65</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica</i> Mill ex Muenchh
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 95
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco recto aplomado, cruz alineada y abultada. Copa centrada reducida. Estructura de tipo reactivo con orden de ramificación poco desarrollado
	Corteza: Cerrada. Secciones de poda pequeñas con madera sana
Estado fitopatológico: Aceptable, afección sobrellevada por <i>Corythucha ciliata</i> sin focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie Nº: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">66</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica</i> Mill ex Muenchh
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 68
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado
	Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">67</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica</i> Mill ex Muenchh
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 98
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado
	Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie Nº: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">68</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica</i> Mill ex Muenchh
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 95
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado
	Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	


Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">69</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica</i> Mill ex Muenchh
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 85
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Casi irregular, abierta. Tronco engrosado en la cruz. Copa excentrica no bien distribuida. Estructura de tipo reactivo, en curso de rehacer un orden
	Corteza: Descortezamientos. Abierta en heridas de poda con madera al aire alterada.
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por efecto de Corythucha ciliata (tigre). Socavamento de madera por descomposición, exudaciones	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	


Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie Nº: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">70</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 120
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado
	Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">71</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica</i> Mill ex Muenchh
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 125
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Casi irregular, abierta. Tronco engrosado en la cruz. Copa excentrica no bien distribuida. Estructura de tipo reactivo, en curso de rehacer un orden
	Corteza: Descortezamientos. Abierta en heridas de poda con madera al aire alterada.
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por efecto de Corythucha ciliata (tigre). Socavamento de madera por descomposición, exudaciones	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	


Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">72</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 107
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Casi irregular, abierta. Tronco engrosado en la cruz. Copa excentrica no bien distribuida. Estructura de tipo reactivo, en curso de rehacer un orden
	Corteza: Descortezamientos. Abierta en heridas de poda con madera al aire alterada.
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por efecto de <i>Corythucha ciliata</i> (tigre). Socavamento de madera por descomposición, exudaciones	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">73</p>
	<p style="text-align: center;">DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 116
	<p style="text-align: center;">ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado
	Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie Nº: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">74</p>
	<p style="text-align: center;">DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica</i> Mill ex Muenchh
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 119
	<p style="text-align: center;">ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado
	Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie Nº: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">75</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 120
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado
	Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie Nº: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">76</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica</i> Mill ex Muenchh
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 91
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado
	Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie Nº: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">77</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 101
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado
	Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	


Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie Nº: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">78</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 78
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Casi irregular, abierta. Tronco engrosado en la cruz. Copa excentrica no bien distribuida. Estructura de tipo reactivo, en curso de rehacer un orden
	Corteza: Descortezamientos. Abierta en heridas de poda con madera al aire alterada.
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por efecto de <i>Corythucha ciliata</i> (tigre). Socavamento de madera por descomposición, exudaciones	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	


Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">79</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica</i> Mill ex Muenchh
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 94
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Casi irregular, abierta. Tronco engrosado en la cruz. Copa excentrica no bien distribuida. Estructura de tipo reactivo, en curso de rehacer un orden
	Corteza: Descortezamientos. Abierta en heridas de poda con madera al aire alterada.
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por efecto de Corythucha ciliata (tigre). Socavamento de madera por descomposición, exudaciones	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie Nº: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">80</p>
	<p style="text-align: center;">DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica</i> Mill ex Muenchh
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 114
	<p style="text-align: center;">ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Casi irregular, abierta. Tronco engrosado en la cruz. Copa excentrica no bien distribuida. Estructura de tipo reactivo, en curso de rehacer un orden
	Corteza: Descortezamientos. Abierta en heridas de poda con madera al aire alterada.
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por efecto de <i>Corythucha ciliata</i> (tigre). Socavamento de madera por descomposición, exudaciones	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie Nº: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">81</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica</i> Mill ex Muenchh
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 104
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Casi irregular, abierta. Tronco engrosado en la cruz. Copa excentrica no bien distribuida. Estructura de tipo reactivo, en curso de rehacer un orden
	Corteza: Descortezamientos. Abierta en heridas de poda con madera al aire alterada.
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por efecto de Corythucha ciliata (tigre). Socavamento de madera por descomposición, exudaciones	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">82</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 79
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco recto aplomado, cruz alineada y abultada. Copa centrada reducida. Estructura de tipo reactivo con orden de ramificación poco desarrollado
	Corteza: Cerrada. Secciones de poda pequeñas con madera sana
Estado fitopatológico: Aceptable, afección sobrellevada por <i>Corythucha ciliata</i> sin focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	


Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">83</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica</i> Mill ex Muenchh
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 88
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado
	Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie Nº: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">84</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 88
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado
	Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie Nº: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">85</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica</i> Mill ex Muenchh
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 79
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado
Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado	
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	


Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">86</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica</i> Mill ex Muenchh
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 88
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco recto aplomado, cruz alineada y abultada. Copa centrada reducida. Estructura de tipo reactivo con orden de ramificación poco desarrollado
	Corteza: Cerrada. Secciones de poda pequeñas con madera sana
Estado fitopatológico: Aceptable, afección sobrellevada por <i>Corythucha ciliata</i> sin focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">87</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 69
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco recto aplomado, cruz alineada y abultada. Copa centrada reducida. Estructura de tipo reactivo con orden de ramificación poco desarrollado
	Corteza: Cerrada. Secciones de poda pequeñas con madera sana
Estado fitopatológico: Aceptable, afección sobrellevada por <i>Corythucha ciliata</i> sin focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie Nº: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">88</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 78
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado
	Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	


Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">89</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 78
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado
	Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">90</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 79
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Casi irregular, abierta. Tronco engrosado en la cruz. Copa excentrica no bien distribuida. Estructura de tipo reactivo, en curso de rehacer un orden
	Corteza: Descortezamientos. Abierta en heridas de poda con madera al aire alterada.
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por efecto de <i>Corythucha ciliata</i> (tigre). Socavamento de madera por descomposición, exudaciones	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">91</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 75
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado
	Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">92</p>
	DATOS DENDROMÉTRICOS
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 69
	ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO
	Conformación: Regular ascendente. Tronco recto aplomado, cruz alineada y abultada. Copa centrada reducida. Estructura de tipo reactivo con orden de ramificación poco desarrollado
	Corteza: Cerrada. Secciones de poda pequeñas con madera sana
Estado fitopatológico: Aceptable, afección sobrellevada por <i>Corythucha ciliata</i> sin focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
OBSERVACIONES	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">93</p>
	<p style="text-align: center;">DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 88
	<p style="text-align: center;">ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado
	Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p>	

<p>Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009</p>	<p>Pie Nº: 94</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	<p>Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i></p>
	<p>Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan</p>
	<p>Tipo: Frondosa alineación</p>
	<p>Perímetro (cm): 66</p>
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	<p>Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado</p>
	<p>Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado</p>
<p>Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera</p>	
<p>Manejo: Reducción drástica de copa, periódica</p>	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">95</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 79
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Casi irregular, abierta. Tronco engrosado en la cruz. Copa excentrica no bien distribuida. Estructura de tipo reactivo, en curso de rehacer un orden
Corteza: Descortezamientos. Abierta en heridas de poda con madera al aire alterada.	
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por efecto de Corythucha ciliata (tigre). Socavamento de madera por descomposición, exudaciones	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie Nº: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">96</p>
	<p style="text-align: center;">DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 88
	<p style="text-align: center;">ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado
Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado	
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">97</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 92
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Casi irregular, abierta. Tronco engrosado en la cruz. Copa excentrica no bien distribuida. Estructura de tipo reactivo, en curso de rehacer un orden
	Corteza: Descortezamientos. Abierta en heridas de poda con madera al aire alterada.
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por efecto de <i>Corythucha ciliata</i> (tigre). Socavamento de madera por descomposición, exudaciones	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	

<p>Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009</p>	<p>Pie Nº: 98</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	<p>Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i></p>
	<p>Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan</p>
	<p>Tipo: Frondosa alineación</p>
	<p>Perímetro (cm): 90</p>
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	<p>Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado</p>
	<p>Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado</p>
<p>Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera</p>	
<p>Manejo: Reducción drástica de copa, periódica</p>	
<p>OBSERVACIONES</p>	


Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">99</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 85
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Casi irregular, abierta. Tronco engrosado en la cruz. Copa excentrica no bien distribuida. Estructura de tipo reactivo, en curso de rehacer un orden
	Corteza: Descortezamientos. Abierta en heridas de poda con madera al aire alterada.
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por efecto de <i>Corythucha ciliata</i> (tigre). Socavamento de madera por descomposición, exudaciones	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie Nº: <p style="text-align: center;">100</p>
	DATOS DENDROMÉTRICOS
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 90
	ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO
	Conformación: Casi irregular, abierta. Tronco engrosado en la cruz. Copa excentrica no bien distribuida. Estructura de tipo reactivo, en curso de rehacer un orden
	Corteza: Descortezamientos. Abierta en heridas de poda con madera al aire alterada.
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por efecto de <i>Corythucha ciliata</i> (tigre). Socavamento de madera por descomposición, exudaciones	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
OBSERVACIONES	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">101</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Ailanthus altissimo</i> (Mill.) Swingle
	Nombre común: Ailanto
	Tipo: Frondosa, pie suelto
	Perímetro (cm): 82
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular vertical. Tronco con cruz ahorquillada a 2,5 m. de altura. Copa centrada, recogida, distribuida. Estructura con orden de ramificación completo, jerarquizado
	Corteza: Cerrada sin daños
Estado fitopatológico: Bueno, sin señales de afección	
Manejo: Ninguno	
<p>OBSERVACIONES</p> Ejemplar de implantación espontánea	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie Nº: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">102</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 91
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado
	Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie Nº: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">103</p>
	<p style="text-align: center;">DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 78
	<p style="text-align: center;">ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado
	Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie Nº: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">104</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 85
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado
	Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">105</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 114
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Casi irregular, abierta. Tronco engrosado en la cruz. Copa excentrica no bien distribuida. Estructura de tipo reactivo, en curso de rehacer un orden
	Corteza: Descortezamientos. Abierta en heridas de poda con madera al aire alterada.
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por efecto de <i>Corythucha ciliata</i> (tigre). Socavamento de madera por descomposición, exudaciones	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie Nº: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">106</p>
	<p style="text-align: center;">DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 110
	<p style="text-align: center;">ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Casi irregular, abierta. Tronco engrosado en la cruz. Copa excentrica no bien distribuida. Estructura de tipo reactivo, en curso de rehacer un orden
	Corteza: Descortezamientos. Abierta en heridas de poda con madera al aire alterada.
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por efecto de <i>Corythucha ciliata</i> (tigre). Socavamento de madera por descomposición, exudaciones	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie Nº: <p style="text-align: center;">107</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Populus alba L. Pyramidalis</i>
	Nombre común: Boleana, chopo boleana, álamo
	Tipo: Frondosa, pie suelto
	Perímetro (cm): 107
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Irregular. Eje dominante de crecimiento suprimido, reemplazado por conjunto desordenado de tallos. Copa descentrada mal distribuida. Estructura trastocada, sin posible recuperación de un orden
Corteza: Abierta en secciones de poda y oquedad del tronco. Madera al aire	
Estado fitopatológico: Deficiente. Afección por procesos de alteración de madera. Síntomas de decrepitud (puntiseco)	
Manejo: Reducción de copa antigua	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie Nº: <p style="text-align: center;">108</p>
	DATOS DENDROMÉTRICOS
	Nombre botánico: <i>Populus alba L. Pyramidalis</i>
	Nombre común: Boleana, chopo boleana, álamo
	Tipo: Frondosa, pie suelto
	Perímetro (cm): 94
	ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO
	Conformación: Irregular. Eje dominante de crecimiento suprimido, reemplazado por conjunto desordenado de tallos. Copa descentrada mal distribuida. Estructura trastocada, sin posible recuperación de un orden
Corteza: Abierta en secciones de poda y oquedad del tronco. Madera al aire	
Estado fitopatológico: Deficiente. Afección por procesos de alteración de madera. Síntomas de decrepitud (puntiseco)	
Manejo: Reducción de copa antigua	
OBSERVACIONES	

<p>: Cuartel Artillería Fecha: 1/04/2022</p>	<p>Pie Nº: 109</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	<p>Nombre botánico: <i>Pittosporum tobira</i>. Pendiente de analisis dendrometrico</p>
	<p>Nombre común:</p>
	<p>Tipo:</p>
	<p>Perímetro (cm): 47</p>
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	<p>Conformación:</p>
<p>Corteza:</p>	
<p>Estado fitopatológico:</p>	
<p>Manejo:</p>	
<p>OBSERVACIONES Ejemplar de posible implantación espontánea</p>	

<p>: Cuartel Artillería Fecha: 1/04/2022</p>	<p>Pie Nº: 110</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	<p>Nombre botánico: <i>Cupressus sempervirens</i> pendiente de análisis.</p>
	<p>Nombre común:</p>
	<p>Tipo:</p>
	<p>Perímetro (cm): 47</p>
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	<p>Conformación:</p>
<p>Corteza:</p>	
<p>Estado fitopatológico:</p>	
<p>Manejo:</p>	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">111</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Morus alba L.</i>
	Nombre común: <i>Morera</i>
	Tipo: <i>Frondosa, pie suelto</i>
	Perímetro (cm): <i>80</i>
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: <i>Regular. Tronco algo inclinado con cruz a 2,20 m. con inserciones convergentes apretadas. Copa centrada y bien repartida. Estructura en vaso, con orden de ramificación en desarrollo bastante jerarquizado</i>
Corteza: <i>Cerrada. Pequeñas heridas sin alteración de madera</i>	
Estado fitopatológico: <i>Bueno, sin señales de afección</i>	
Manejo: <i>Algún desrame ligero</i>	
<p>OBSERVACIONES</p> <i>Ejemplar de implantación espontánea</i>	


<p>Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009</p>	<p>Pie N°: 112</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	<p>Nombre botánico: <i>Leucaena Leucocephala</i></p>
	<p>Nombre común: Acacia pálida, aroma blanco, mimosa</p>
	<p>Tipo: Exótica subtropical, pie suelto</p>
	<p>Perímetro (cm): 50</p>
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	<p>Conformación: Irregular, abierta. Dos tallos primarios codominantes y divergentes. Copa centrada no bien distribuida. Estructura difusa, con orden de ramificación poco desarrollado.</p>
	<p>Corteza: Cerrada. Herida con madera al aire, sin alteración</p>
<p>Estado fitopatológico: Bueno, sin señales de afección</p>	
<p>Manejo: Algún desrame muy ligero y esporádico.</p>	
<p>OBSERVACIONES Ejemplar de implantación espontánea. Especie invasora.</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">113</p>
	<p style="text-align: center;">DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Ulmus var. (sección glabra)</i>
	Nombre común: Olmo
	Tipo: Frondosa, pie suelto
	Perímetro (cm): 75
	<p style="text-align: center;">ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Irregular abierta. Tronco aplomado con cruz a 2,30 m. de alt. Bifurcada. Entronques abultados y cortos. Copa algo excéntrica, distribuida. Estructura de tipo reactivo con orden de ramificación rehaciéndose, desigualmente jerarquizado
	Corteza: Abierta en heridas de poda, con madera alterada
Estado fitopatológico: Deficiente. Afección por <i>Xanthogaleruca luteola</i> (galeruca). Focos de pudrición en los entronques de la cruz	
Manejo: Reducción fuerte de copa	
<p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p>	


Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie Nº: <p style="text-align: center;">114</p>
	DATOS DENDROMÉTRICOS
	Nombre botánico: <i>Washingtonia filifera</i>
	Nombre común: Palmera de abanico, palma de Washigton
	Tipo: Exótica subtropical, pie suelto
	Perímetro (cm): 267
	ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO
	Conformación: Regular, axial. Estípite de 6,0 m de altura aprox. Corona esférica, poblada. Acumulación de palma seca
	Corteza: Superficie cerrada de restos de bases foliares, bien igualada
Estado fitopatológico: Bueno, sin señales de afección	
Manejo: Ninguno	
OBSERVACIONES	


Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie Nº: <p style="text-align: center;">115</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Citrus sinensis (L.) Osbeck</i>
	Nombre común: Naranja
	Tipo: Cultivo tradicional, en grupo
	Perímetro (cm): 53
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Casi regular recogida. Pie injerto ramificado a 0,50 m de alt. Aprox. Con 2-3 ejes abiertos y cortos. Copa centrada y distribuida. Estructura en vaso, con orden de ramificación interrumpido mal rehecho.
	Corteza: Cerrada. Secciones de poda limpias, sin cicatrizar.
Estado fitopatológico: Aceptable. Algo de cóccido en hojas (Coccus sp, lecanino). Presencia de brotes con hoja abullonada	
Manejo: Poda de mantenimiento	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">116</p>
	<p style="text-align: center;">DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Citrus limon (L.) Burn</i>
	Nombre común: Limonero
	Tipo: Cultivo tradicional, en grupo
	Perímetro (cm): 47
	<p style="text-align: center;">ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Irregular, recogida. Tronco corto pero prolongado sobre la primera cruz, al perderse esta; sinuoso. Copa excéntrica, no bien distribuida. Estructura alterada, con orden de ramificación poco desarrollado
	Corteza: Abierta en secciones de poda limpias, sin cicatrizar. Alguna rotura con madera al aire
Estado fitopatológico: Aceptable. Pequeña presencia de cóccidos	
Manejo: Poda de mantenimiento	
<p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p>	


Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">117</p>
	<p style="text-align: center;">DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck
	Nombre común: Naranja
	Tipo: Cultivo tradicional, en grupo
	Perímetro (cm): 56
	<p style="text-align: center;">ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Casi regular recogida. Pie injerto ramificado a 0,50 m de alt. Aprox. Con 2-3 ejes abiertos y cortos. Copa centrada y distribuida. Estructura en vaso, con orden de ramificación interrumpido mal rehecho.
	Corteza: Cerrada. Secciones de poda limpias, sin cicatrizar.
Estado fitopatológico: Aceptable. Algo de cóccido en hojas (Coccus sp, lecanino). Presencia de brotes con hoja abullonada	
Manejo: Poda de mantenimiento	
<p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p>	

: Cuartel Artillería Fecha: 1/04/2022	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">118</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: Melia azedarach. Árbol de crecimiento espontáneo.
	Nombre común:
	Tipo:
	Perímetro (cm): 47
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación:
	Corteza:
Estado fitopatológico:	
Manejo:	
<p>OBSERVACIONES</p> Ejemplar de implantación espontánea	

<p>: Cuartel Artillería Fecha: 1/04/2022</p>	<p>Pie N°: 119</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	<p>Nombre botánico: Melia azedarach. Árbol de crecimiento espontaneo.</p>
	<p>Nombre común:</p>
	<p>Tipo:</p>
	<p>Perímetro (cm): 47</p>
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	<p>Conformación:</p>
<p>Corteza:</p>	
<p>Estado fitopatológico:</p>	
<p>Manejo:</p>	
<p>OBSERVACIONES Ejemplar de implantación espontánea</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">120</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck
	Nombre común: Naranja
	Tipo: Cultivo tradicional, en grupo
	Perímetro (cm): 38
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Casi regular recogida. Pie injerto ramificado a 0,50 m de alt. Aprox. Con 2-3 ejes abiertos y cortos. Copa centrada y distribuida. Estructura en vaso, con orden de ramificación interrumpido mal rehecho.
	Corteza: Cerrada. Secciones de poda limpias, sin cicatrizar.
	Estado fitopatológico: Aceptable. Algo de cóccido en hojas (Coccus sp, lecanino). Presencia de brotes con hoja abullonada
Manejo: Poda de mantenimiento	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">121</p>
	<p style="text-align: center;">DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Citrus limon (L.) Burn</i>
	Nombre común: Limonero
	Tipo: Cultivo tradicional, en grupo
	Perímetro (cm): 48
	<p style="text-align: center;">ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Irregular, recogida. Tronco corto pero prolongado sobre la primera cruz, al perderse esta; sinuoso. Copa excéntrica, no bien distribuida. Estructura alterada, con orden de ramificación poco desarrollado
	Corteza: Abierta en secciones de poda limpias, sin cicatrizar. Alguna rotura con madera al aire
Estado fitopatológico: Aceptable. Pequeña presencia de cóccidos	
Manejo: Poda de mantenimiento	
<p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">122</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck
	Nombre común: Naranja
	Tipo: Cultivo tradicional, en grupo
	Perímetro (cm): 37
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Casi regular recogida. Pie injerto ramificado a 0,50 m de alt. Aprox. Con 2-3 ejes abiertos y cortos. Copa centrada y distribuida. Estructura en vaso, con orden de ramificación interrumpido mal rehecho.
	Corteza: Cerrada. Secciones de poda limpias, sin cicatrizar.
Estado fitopatológico: Aceptable. Algo de cóccido en hojas (Coccus sp, lecanino). Presencia de brotes con hoja abullonada	
Manejo: Poda de mantenimiento	
<p>OBSERVACIONES</p>	

<p>: Cuartel Artillería Fecha: 1/04/2022</p>	<p>Pie N°: 123</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	<p>Nombre botánico: Melia azedarach. Árbol de crecimiento espontaneo.</p>
	<p>Nombre común:</p>
	<p>Tipo:</p>
	<p>Perímetro (cm): 47</p>
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	<p>Conformación:</p>
<p>Corteza:</p>	
<p>Estado fitopatológico:</p>	
<p>Manejo:</p>	
<p>OBSERVACIONES Ejemplar de implantación espontánea</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">124</p>
	<p style="text-align: center;">DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck
	Nombre común: Naranja
	Tipo: Cultivo tradicional, en grupo
	Perímetro (cm): 37
	<p style="text-align: center;">ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Casi regular recogida. Pie injerto ramificado a 0,50 m de alt. Aprox. Con 2-3 ejes abiertos y cortos. Copa centrada y distribuida. Estructura en vaso, con orden de ramificación interrumpido mal rehecho.
	Corteza: Cerrada. Secciones de poda limpias, sin cicatrizar.
Estado fitopatológico: Regular. Algo de cóccido en hojas (Coccus sp, lecanino). Presencia de brotes con hoja abullonada	
Manejo: Poda de mantenimiento	
<p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center;">125</p>
	DATOS DENDROMÉTRICOS
	Nombre botánico: <i>Melia azedarach L.</i>
	Nombre común: Melia, cinamomo
	Tipo: Frondosa, pie suelto
	Perímetro (cm): 54
	ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO
	Conformación: Regular, abierta. Tallos primarios codominantes desde la base del tronco cercenado. Copa centrada distribuida. Estructura reactiva, de tipo simpódico. Orden de ramificación natural bastante desarrollado, en aumento
	Corteza: Cerrada secciones de poda limpias sin madera alterada
Estado fitopatológico: Bueno, sin señales de afección	
Manejo: Algún desrame ligero	
OBSERVACIONES	

: Cuartel Artillería Fecha: 1/04/2022	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">126</p>
	<p style="text-align: center;">DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: Melia azedarach. Árbol de crecimiento espontáneo.
	Nombre común:
	Tipo:
	Perímetro (cm):
	<p style="text-align: center;">ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación:
	Corteza:
Estado fitopatológico:	
Manejo:	
<p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p> Ejemplar de implantación espontánea	

<p>: Cuartel Artillería Fecha: 1/04/2022</p>	<p>Pie N°: 127</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	<p>Nombre botánico: Melia azedarach. Árbol de crecimiento espontáneo.</p>
	<p>Nombre común:</p>
	<p>Tipo:</p>
	<p>Perímetro (cm):</p>
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	<p>Conformación:</p>
	<p>Corteza:</p>
<p>Estado fitopatológico:</p>	
<p>Manejo:</p>	
<p>OBSERVACIONES Ejemplar de implantación espontánea</p>	


: Cuartel Artillería Fecha: 1/04/2022	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">128</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: Melia azedarach. Árbol de crecimiento espontáneo.
	Nombre común:
	Tipo:
	Perímetro (cm):
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación:
	Corteza:
Estado fitopatológico:	
Manejo:	
<p>OBSERVACIONES</p> Ejemplar de implantación espontánea	


Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">129</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Melia azedarach L.</i>
	Nombre común: <i>Melia, cinamomo</i>
	Tipo: <i>Frondosa, pie suelto</i>
	Perímetro (cm): <i>116</i>
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: <i>Irregular, abierta. Tronco inclinado, engrosado en la cruz por congestión en los entronques. Copa centrada, no bien distribuida, aclarada. Estructura de tipo reactivo, con orden de ramificación trastocado, mal rehecho.</i>
	Corteza: <i>Abierta en heridas de poda, con madera alterada</i>
Estado fitopatológico: <i>Deficiente. Algo de rama seca. Distintos focos de pudrición. Oquedades</i>	
Manejo: <i>Reducción fuerte de copa, periódica</i>	
<p>OBSERVACIONES</p>	


Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center;">130</p>
	DATOS DENDROMÉTRICOS
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica</i> Mill ex Muenchh
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 85
	ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO
	Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado
	Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
OBSERVACIONES	


Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">131</p>
	<p style="text-align: center;">DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 94
	<p style="text-align: center;">ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado
	Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie Nº: <p style="text-align: center;">132</p>
	DATOS DENDROMÉTRICOS
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 94
	ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO
	Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado
	Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
OBSERVACIONES	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie Nº: <p style="text-align: center;">133</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 88
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado
	Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	


Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie Nº: <p style="text-align: center;">134</p>
	DATOS DENDROMÉTRICOS
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 91
	ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO
	Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado
	Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
OBSERVACIONES	


Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie Nº: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">135</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 106
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado
	Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">136</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 126
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado
	Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">137</p>
	<p style="text-align: center;">DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica</i> Mill ex Muenchh
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 107
	<p style="text-align: center;">ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco recto aplomado, cruz alineada y abultada. Copa centrada reducida. Estructura de tipo reactivo con orden de ramificación poco desarrollado
	Corteza: Cerrada. Secciones de poda pequeñas con madera sana
Estado fitopatológico: Aceptable, afección sobrellevada por <i>Corythucha ciliata</i> sin focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p>	

<p>Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009</p>	<p>Pie Nº: 138</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	<p>Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i></p>
	<p>Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan</p>
	<p>Tipo: Frondosa alineación</p>
	<p>Perímetro (cm): 116</p>
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	<p>Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado</p>
	<p>Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado</p>
<p>Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera</p>	
<p>Manejo: Reducción drástica de copa, periódica</p>	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">139</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 126
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado
	Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie Nº: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">140</p>
	<p style="text-align: center;">DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 101
	<p style="text-align: center;">ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado
	Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">141</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 85
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco recto aplomado, cruz alineada y abultada. Copa centrada reducida. Estructura de tipo reactivo con orden de ramificación poco desarrollado
	Corteza: Cerrada. Secciones de poda pequeñas con madera sana
Estado fitopatológico: Aceptable, afección sobrellevada por <i>Corythucha ciliata</i> sin focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	


<p>Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009</p>	<p>Pie Nº: 142</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	<p>Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i></p>
	<p>Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan</p>
	<p>Tipo: Frondosa alineación</p>
	<p>Perímetro (cm): 90</p>
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	<p>Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado</p>
	<p>Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado</p>
<p>Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera</p>	
<p>Manejo: Reducción drástica de copa, periódica</p>	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">143</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Pinus halepensis</i> Mill
	Nombre común: Pino carrasco
	Tipo: Conifera, en alineación
	Perímetro (cm): 167
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Irregular axial abierta. Tronco ramificado a partir de los 6,50 m de alt aprox. Copa repartida con ejes primarios fuertes, muy ramosos.
	Corteza: Cerrada. Secciones de poda limpias, alguna grande sin madera alterada.
Estado fitopatológico: Bueno, sin señales de afección	
Manejo: Refaldado de copa, periódico	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">144</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Pinus halepensis</i> Mill
	Nombre común: Pino carrasco
	Tipo: Conifera, en alineación
	Perímetro (cm): 157
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Irregular axial abierta. Tronco inclinado ramificado a partir de los 7m de altura aprox. Copa excéntrica repartida con ejes primarios fuertes, muy ramosos.
	Corteza: Cerrada. Secciones de poda limpias, alguna grande sin madera alterada.
Estado fitopatológico: Bueno, sin señales de afección	
Manejo: Refaldado de copa, periódico	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">145</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Pinus halepensis Mill</i>
	Nombre común: Pino carrasco
	Tipo: Conífera, en alineación
	Perímetro (cm): 94
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Irregular axial abierta. Tronco inclinado ramificado a partir de los 6,50m de altura aprox. Copa excéntrica repartida con ejes primarios fuertes, muy ramosos.
	Corteza: Cerrada. Secciones de poda limpias, alguna grande sin madera alterada.
Estado fitopatológico: Bueno, sin señales de afección	
Manejo: Refaldado de copa, periódico	
<p>OBSERVACIONES</p>	


Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">146</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 110
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco recto aplomado, cruz alineada y abultada. Copa centrada reducida. Estructura de tipo reactivo con orden de ramificación poco desarrollado
	Corteza: Cerrada. Secciones de poda pequeñas con madera sana
Estado fitopatológico: Aceptable, afección sobrellevada por <i>Corythucha ciliata</i> sin focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">147</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Platanus x hispanica Mill ex Muenchh</i>
	Nombre común: Plátano de paseo, plátano de sombra, plàtan
	Tipo: Frondosa alineación
	Perímetro (cm): 94
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular ascendente. Tronco prolongado sobre la 1ª cruz, con la 2ª copa centrada, distribuida. Estructura de tipo desplazada, reactiva, con orden de ramificación apenas diferenciado
	Corteza: Abierta en heridas de poda con madera alterada. Oquedades con socavamiento no determinado
Estado fitopatológico: Deficiente. Follaje clorótico por corythucha ciliata y distintos focos de pudrición de madera	
Manejo: Reducción drástica de copa, periódica	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">148</p>
	<p style="text-align: center;">DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.</i>
	Nombre común: Nispero del Japón
	Tipo: Frutal de ornamento, pie suelto
	Perímetro (cm): 74
	<p style="text-align: center;">ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Bastante regular, extendida. Tronco prolongado en altura conservando dominancia. Copa algo excéntrica, sin distribuir bien. Estructura de ramificación reconduciéndose falta de desarrollo
	Corteza: Abierta en heridas antiguas de poda. Alguna oquedad pequeña
Estado fitopatológico: Deficiente. Frutos momificados y extremo de tallos ennegrecidos. Fumagina o negrilla (Capnodium spp)	
Manejo: Actualmente ninguno	
<p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">149</p>
	<p style="text-align: center;">DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Robinia pseudoacacia L.</i>
	Nombre común: Acacia robinia, falsa acacia
	Tipo: Frondosa, pie suelto
	Perímetro (cm): 129
	<p style="text-align: center;">ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Irregular. Tronco sinuoso e inclinado con cruz bifurcada a nivel de un drástico rebaje de copa previo (2,80 m de alt, aprox) Copa excéntrica no bien repartida. Estructura reactiva algo reconducida, orden de ramificación mal rehecho.
	Corteza: Abierta en heridas de poda grandes. Rotura con descortezamiento en tronco con madera alterada
Estado fitopatológico: Malo. Proceso de pudrición lento pero ya avanzado.	
Manejo: Reducción drástica de copa (desmoche)	
<p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">150</p>
	<p style="text-align: center;">DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Robinia pseudoacacia L.</i>
	Nombre común: Acacia robinia, falsa acacia
	Tipo: Frondosa, pie suelto
	Perímetro (cm): 141
	<p style="text-align: center;">ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Irregular. Tronco sinuoso e inclinado con cruz bifurcada a nivel de un drástico rebaje de copa previo (2,80 m de alt, aprox) Copa excéntrica no bien repartida. Estructura reactiva algo reconducida, orden de ramificación mal rehecho.
	Corteza: Abierta en heridas de poda grandes. Rotura con descortezamiento en tronco con madera alterada
Estado fitopatológico: Malo. Proceso de pudrición lento pero ya avanzado.	
Manejo: Reducción drástica de copa (desmoche)	
<p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">151</p>
	<p style="text-align: center;">DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Robinia pseudoacacia L.</i>
	Nombre común: Acacia robinia, falsa acacia
	Tipo: Frondosa, pie suelto
	Perímetro (cm): 132
	<p style="text-align: center;">ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Irregular. Tronco sinuoso e inclinado con cruz bifurcada a nivel de un drástico rebaje de copa previo (2,80 m de alt, aprox) Copa excéntrica no bien repartida. Estructura reactiva algo reconducida, orden de ramificación mal rehecho.
	Corteza: Abierta en heridas de poda grandes. Rotura con descortezamiento en tronco con madera alterada
Estado fitopatológico: Malo. Proceso de pudrición lento pero ya avanzado.	
Manejo: Reducción drástica de copa (desmoche)	
<p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie Nº: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">152</p>
	<p style="text-align: center;">DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Pinus halepensis Mill</i>
	Nombre común: Pino carrasco
	Tipo: Conifera, en alineación
	Perímetro (cm): 104
	<p style="text-align: center;">ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Regular, axial. Tronco algo inclinado ramificado a partir de 4,6 m de alt aprox copa algo excéntrica, repartida. Estructura monopódica, con orden de ramificación natural, poco desarrollado todavía
	Corteza: Cerrado, sin daños
Estado fitopatológico: Bueno, sin señales de afección	
Manejo: Refaldado	
<p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">153</p>
	<p style="text-align: center;">DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Robinia pseudoacacia L.</i>
	Nombre común: Acacia robinia, falsa acacia
	Tipo: Frondosa, pie suelto
	Perímetro (cm): 141
	<p style="text-align: center;">ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Irregular. Tronco sinuoso e inclinado con cruz bifurcada a nivel de un drástico rebaje de copa previo (2,80 m de alt, aprox) Copa excéntrica no bien repartida. Estructura reactiva algo reconducida, orden de ramificación mal rehecho.
	Corteza: Abierta en heridas de poda grandes. Rotura con descortezamiento en tronco con madera alterada
Estado fitopatológico: Malo. Proceso de pudrición lento pero ya avanzado.	
Manejo: Reducción drástica de copa (desmoche)	
<p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">154</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Robinia pseudoacacia L.</i>
	Nombre común: Acacia robinia, falsa acacia
	Tipo: Frondosa, en alineación
	Perímetro (cm): 154
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Irregular. Tronco sinuoso e inclinado con cruz bifurcada a nivel de un drástico rebaje de copa previo (2,80 m de alt, aprox) Copa excéntrica no bien repartida. Estructura reactiva algo reconducida, orden de ramificación mal rehecho.
	Corteza: Abierta en heridas de poda grandes. Rotura con descortezamiento en tronco con madera alterada
Estado fitopatológico: Malo. Proceso de pudrición lento pero ya avanzado.	
Manejo: Reducción drástica de copa (desmoche)	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">155</p>
	<p style="text-align: center;">DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Robinia pseudoacacia L.</i>
	Nombre común: Acacia robinia, falsa acacia
	Tipo: Frondosa, en alineación
	Perímetro (cm): 107
	<p style="text-align: center;">ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Irregular. Tronco sinuoso e inclinado con cruz bifurcada a nivel de un drástico rebaje de copa previo (2,80 m de alt, aprox) Copa excéntrica no bien repartida. Estructura reactiva algo reconducida, orden de ramificación mal rehecho.
Corteza: Abierta en heridas de poda grandes. Rotura con descortezamiento en tronco con madera alterada	
Estado fitopatológico: Malo. Proceso de pudrición lento pero ya avanzado.	
Manejo: Reducción drástica de copa (desmoche)	
<p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p>	


Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">156</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Robinia pseudoacacia L.</i>
	Nombre común: Acacia robinia, falsa acacia
	Tipo: Frondosa, en alineación
	Perímetro (cm): 82
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Irregular. Tronco sinuoso e inclinado con cruz bifurcada a nivel de un drástico rebaje de copa previo (2,80 m de alt, aprox) Copa excéntrica no bien repartida. Estructura reactiva algo reconducida, orden de ramificación mal rehecho.
Corteza: Abierta en heridas de poda grandes. Rotura con descortezamiento en tronco con madera alterada	
Estado fitopatológico: Malo. Proceso de pudrición lento pero ya avanzado.	
Manejo: Reducción drástica de copa (desmoche)	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">157</p>
	<p style="text-align: center;">DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Robinia pseudoacacia L.</i>
	Nombre común: Acacia robinia, falsa acacia
	Tipo: Frondosa, en alineación
	Perímetro (cm): 78
	<p style="text-align: center;">ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Irregular. Tronco sinuoso e inclinado con cruz bifurcada a nivel de un drástico rebaje de copa previo (2,80 m de alt, aprox) Copa excéntrica no bien repartida. Estructura reactiva algo reconducida, orden de ramificación mal rehecho.
	Corteza: Abierta en heridas de poda grandes. Rotura con descortezamiento en tronco con madera alterada
Estado fitopatológico: Malo. Proceso de pudrición lento pero ya avanzado.	
Manejo: Reducción drástica de copa (desmoche)	
<p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie Nº: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">158</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Robinia pseudoacacia L.</i>
	Nombre común: Acacia robinia, falsa acacia
	Tipo: Frondosa, en alineación
	Perímetro (cm): 66
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Irregular. Tronco sinuoso e inclinado con cruz bifurcada a nivel de un drástico rebaje de copa previo (2,80 m de alt, aprox) Copa excéntrica no bien repartida. Estructura reactiva algo reconducida, orden de ramificación mal rehecho.
Corteza: Abierta en heridas de poda grandes. Rotura con descortezamiento en tronco con madera alterada	
Estado fitopatológico: Malo. Proceso de pudrición lento pero ya avanzado.	
Manejo: Reducción drástica de copa (desmoche)	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">159</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Robinia pseudoacacia L.</i>
	Nombre común: Acacia robinia, falsa acacia
	Tipo: Frondosa, en alineación
	Perímetro (cm): 97
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Irregular. Tronco sinuoso e inclinado con cruz bifurcada a nivel de un drástico rebaje de copa previo (2,80 m de alt, aprox) Copa excéntrica no bien repartida. Estructura reactiva algo reconducida, orden de ramificación mal rehecho.
	Corteza: Abierta en heridas de poda grandes. Rotura con descortezamiento en tronco con madera alterada
Estado fitopatológico: Malo. Proceso de pudrición lento pero ya avanzado.	
Manejo: Reducción drástica de copa (desmoche)	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">160</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Robinia pseudoacacia L.</i>
	Nombre común: Acacia robinia, falsa acacia
	Tipo: Frondosa, en alineación
	Perímetro (cm): 89
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Irregular. Tronco sinuoso e inclinado con cruz bifurcada a nivel de un drástico rebaje de copa previo (2,80 m de alt, aprox) Copa excéntrica no bien repartida. Estructura reactiva algo reconducida, orden de ramificación mal rehecho.
	Corteza: Abierta en heridas de poda grandes. Rotura con descortezamiento en tronco con madera alterada
Estado fitopatológico: Malo. Proceso de pudrición lento pero ya avanzado.	
Manejo: Reducción drástica de copa (desmoche)	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie Nº: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">161</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Robinia pseudoacacia L.</i>
	Nombre común: Acacia robinia, falsa acacia
	Tipo: Frondosa, en alineación
	Perímetro (cm): 87
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Irregular. Tronco sinuoso e inclinado con cruz bifurcada a nivel de un drástico rebaje de copa previo (2,80 m de alt, aprox) Copa excéntrica no bien repartida. Estructura reactiva algo reconducida, orden de ramificación mal rehecho.
Corteza: Abierta en heridas de poda grandes. Rotura con descortezamiento en tronco con madera alterada	
Estado fitopatológico: Malo. Proceso de pudrición lento pero ya avanzado.	
Manejo: Reducción drástica de copa (desmoche)	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">162</p>
	<p style="text-align: center;">DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Robinia pseudoacacia L.</i>
	Nombre común: Acacia robinia, falsa acacia
	Tipo: Frondosa, en alineación
	Perímetro (cm): 107
	<p style="text-align: center;">ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Irregular. Tronco sinuoso e inclinado con cruz bifurcada a nivel de un drástico rebaje de copa previo (2,80 m de alt, aprox) Copa excéntrica no bien repartida. Estructura reactiva algo reconducida, orden de ramificación mal rehecho.
	Corteza: Abierta en heridas de poda grandes. Rotura con descortezamiento en tronco con madera alterada
Estado fitopatológico: Malo. Proceso de pudrición lento pero ya avanzado.	
Manejo: Reducción drástica de copa (desmoche)	
<p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">163</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Robinia pseudoacacia L.</i>
	Nombre común: Acacia robinia, falsa acacia
	Tipo: Frondosa, en alineación
	Perímetro (cm): 142
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Irregular. Tronco sinuoso e inclinado con cruz bifurcada a nivel de un drástico rebaje de copa previo (2,80 m de alt, aprox) Copa excéntrica no bien repartida. Estructura reactiva algo reconducida, orden de ramificación mal rehecho.
Corteza: Abierta en heridas de poda grandes. Rotura con descortezamiento en tronco con madera alterada	
Estado fitopatológico: Malo. Proceso de pudrición lento pero ya avanzado.	
Manejo: Reducción drástica de copa (desmoche)	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center;">164</p>
	DATOS DENDROMÉTRICOS
	Nombre botánico: <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.
	Nombre común: Nispero del Japón
	Tipo: Frutal de ornamento, pie suelto
	Perímetro (cm): 63
	ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO
	Conformación: Irregular. Tronco con la cruz baja (0,90 m de altura) Copa excéntrica, no bien repartida. Estructura forzada, bifurcada, corregida algo tortuosa con orden de ramificación escaso, rehaciendose.
	Corteza: Abierta en secciones de poda limpios cicatrizandose. Madera al aire sin alterar. Algún descortezamiento
Estado fitopatológico: Deficiente. Frutos momificados y extremo de tallos ennegrecidos. Fumagina o negrilla (<i>Capnodium</i> spp)	
Manejo: Poda de aclarado de copa	
OBSERVACIONES	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">165</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Robinia pseudoacacia L.</i>
	Nombre común: Acacia robinia, falsa acacia
	Tipo: Frondosa, en grupo
	Perímetro (cm): 113
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Irregular abierta. Tronco inclinado resuelto en altura en varias líneas de crecimiento, tendentes a codominancia. Copa centrada, no bien repartida. Estructura natural trastocada y rehecha, orden de ramificación específico bastante desarrollado
Corteza:	
Estado fitopatológico: Bueno, sin señales de afección. Algo de ramaje seco	
Manejo: Reducción fuerte de copa	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center;">166</p>
	DATOS DENDROMÉTRICOS
	Nombre botánico: <i>Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.</i>
	Nombre común: Nispero del Japón
	Tipo: Frutal de ornamento, pie suelto
	Perímetro (cm): 56
	ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO
	Conformación: Irregular. Tronco con la cruz baja (0,90 m de altura) Copa excéntrica, no bien repartida. Estructura forzada, bifurcada, corregida algo tortuosa con orden de ramificación escaso, rehaciendose.
	Corteza: Abierta en secciones de poda limpios cicatrizandose. Madera al aire sin alterar. Algún descortezamiento
Estado fitopatológico: Deficiente. Frutos momificados y extremo de tallos ennegrecidos. Fumagina o negrilla (<i>Capnodium spp</i>)	
Manejo: Poda de aclarado de copa	
OBSERVACIONES	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">167</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Robinia pseudoacacia L.</i>
	Nombre común: Acacia robinia, falsa acacia
	Tipo: Frondosa, pie suelto
	Perímetro (cm): 144
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Irregular. Tronco sinuoso e inclinado con cruz bifurcada a nivel de un drástico rebaje de copa previo (2,80 m de alt, aprox) Copa excéntrica no bien repartida. Estructura reactiva algo reconducida, orden de ramificación mal rehecho.
Corteza: Abierta en heridas de poda grandes. Rotura con descortezamiento en tronco con madera alterada	
Estado fitopatológico: Malo. Proceso de pudrición lento pero ya avanzado.	
Manejo: Reducción drástica de copa (desmoche)	
<p>OBSERVACIONES</p>	

Ubicación actual: Cuartel Artillería Fecha: 7/31/2009	Pie N°: <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">168</p>
	<p style="text-align: center;">DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	Nombre botánico: <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.
	Nombre común: Nispero del Japón
	Tipo: Frutal de ornamento, pie suelto
	Perímetro (cm): 72
	<p style="text-align: center;">ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	Conformación: Bastante regular, extendida. Tronco prolongado en altura conservando dominancia. Copa algo excéntrica, sin distribuir bien. Estructura de ramificación reconduciéndose falta de desarrollo
	Corteza: Abierta en heridas antiguas de poda. Alguna oquedad pequeña
Estado fitopatológico: Deficiente. Frutos momificados y extremo de tallos ennegrecidos. Fumagina o negrilla (Capnodium spp)	
Manejo: Actualmente ninguno	
<p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p>	

<p>: Cuartel Artilleria Fecha: 1/04/2022</p>	<p>Pie N°: 169</p>
	<p>DATOS DENDROMÉTRICOS</p>
	<p>Nombre botánico: Árbol de crecimiento espontaneo pendiente de identificación</p>
	<p>Nombre común:</p>
	<p>Tipo:</p>
	<p>Perímetro (cm): 47</p>
	<p>ESTADO BIOMECÁNICO Y FITOSANITARIO</p>
	<p>Conformación:</p>
<p>Corteza:</p>	
<p>Estado fitopatológico:</p>	
<p>Manejo:</p>	
<p>OBSERVACIONES Ejemplar de implantación espontánea</p>	